

Till dig som får behandling med Trulicity® (dulaglutid)

Till dig som får Trulicity®
- SVENSKA

VAD ÄR TRULICITY®

Trulicity® är ett läkemedel som tas en gång i veckan för att förbättra blodsockerkontrollen hos vuxna med typ 2-diabetes.

VARFÖR BEHÖVER JAG TRULICITY®

Diabetes är en sjukdom som kan förändras med tiden. Ibland kan du behöva byta till en behandling som fungerar bättre för dig. Du har fått Trulicity® som behandling av din typ 2-diabetes.

Din läkare kan ordinera det ensamt eller som tillägg till andra diabetesläkemedel tillsammans med kost och motion.

Trulicity® är inte ett insulin. Det hjälper din kropp att tillverka eget insulin för att ditt blodsocker ska hållas under kontroll.

DIN TRULICITY® PENNA

- Du tar Trulicity® en gång i veckan.
- Du kan ta Trulicity® vid valfri tid på dagen, med eller utan måltid.
- Varje penna innehåller endast en dos.
- Du behöver inte sätta på en nål, mäta eller blanda något.
- Nålen är inbyggd och dold.
- Läkemedlet injiceras automatiskt inom 5–10 sekunder efter du har tryckt på knappen.

DOSERING

Trulicity® finns i 4 doser: 0,75 mg, 1,5 mg, 3,0 mg och 4,5 mg. Din läkare bestämmer rätt dos för dig.


Följ din läkares/sjuksköterskas anvisning om hur ofta du ska testa ditt blodsocker. Det kan hjälpa dig att se hur väl din behandling fungerar.

HANTERA BIVERKNINGAR

En vanlig biverkan med Trulicity® är minskad aptit. Då Trulicity® börjar verka upplever en del människor illamående, kräkning eller diarré. Dessa symptom är oftast inte allvarliga och minskar för de flesta efter den andra dosen.

Om illamåendet inte försvinner, eller om det förvärras, kontakta din läkare/ sjuksköterska. Följande råd kan hjälpa dig:

- Ät mindre portioner
- Sluta ät då du känner dig mätt
- Undvik friterad och fet mat.



Lilly

YTTERLIGARE STÖD

WEBBSIDA

På diabetes.lilly.se finner du ytterligare information och användbara tips om Trulicity. Här kan du även se en video om hur du använder pennan.

Ange följande lösenord för att logga in på webbsidan: **1234trul**

Denna information är inte avsedd att innehålla uttömmande information om ditt läkemedel. För ytterligare information om ditt läkemedel skall du tala med din läkare eller hälso- och sjukvårdspersonal. För ytterligare information läs också i bipacksedeln som följer med läkemedelsförpackningen.

Du är också välkommen att kontakta medicinsk information på Lilly.

Telefon: **08-737 8800** (kontorstid)

E-post: scan_medinfo@lilly.com

Läs noga igenom bipacksedeln innan du börjar använda detta läkemedel.

Trulicity 0,75 mg, 1,5 mg, 3 mg, 4,5 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna (dulaglutid).

Trulicity används:

- ensamt om ditt blodsocker inte är väl kontrollerat med hjälp av endast kost och motion och du inte kan ta metformin (ett annat diabetesläkemedel).
- eller tillsammans med andra läkemedel mot diabetes när dessa inte räcker till för att kontrollera ditt blodsockervärde. De andra läkemedlen kan vara sådana som tas via munnen och/eller insulin som du tar genom en injektion.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Trulicity om:

- du får dialys eftersom detta läkemedel då inte rekommenderas
- du har typ 1-diabetes (den typ som innebär att kroppen inte producerar något insulin) eftersom detta läkemedel kanske inte är lämpligt för dig.
- du har diabetesketoacidosis (en komplikation vid diabetes som inträffar när kroppen inte kan bryta ner glukos eftersom det inte finns tillräckligt mycket insulin). Tecken på detta är snabb viktnedgång, illamående eller kräkningar, att andedräkten har en söttaktig lukt, du har en söttaktig smak eller metallsmak i munnen eller att din urin eller svett luktar annorlunda.
- du har svåra matsmältningsbesvär eller problem med att maten stannar längre i magsäcken än normalt (inkluderande gastropares).
- du har haft pankreatit (bukspottkörtelinflammation), vilket ger svåra smärtor i magen och ryggen som inte ger med sig.
- du tar en sulfonureid eller insulin för din diabetes eftersom du kan få lågt blodsocker (hypoglykemi). Din läkare kan behöva ändra dosen av dessa andra läkemedel för att minska risken för detta.
- du blir gravid. Trulicity ska inte användas under graviditet eller amning.

När du påbörjar behandling med Trulicity kan du i vissa fall uppleva vätskeförlust/uttorkning, t.ex. vid kräkningar, illamående och/eller diarré som kan leda till nedsatt njurfunktion. Det är viktigt att undvika uttorkning genom att dricka mycket vätska. Kontakta din läkare om du har några frågor eller problem.

Datum för översyn av produktresumén: 2023-03-06

För ytterligare information se www.fass.se

Eli Lilly Sweden AB, Box 721, 169 27 Solna. 08-737 88 00, www.lilly.se